

Cirugía y Medicina de Rejuvenecimiento

LIFTING FACIAL

I Parte



DR. IVÁN ARROYO TOVAR
CIRUJANO PLÁSTICO
RNE 14400
CMP 10799

Rejuvenecer ha sido siempre un anhelo de hombres y mujeres. Sin embargo, hasta hace pocos años casi exclusivamente mujeres solicitaban un lifting y actualmente un 20% de pacientes son varones.

La mayoría de pacientes que se interesan en una intervención de rejuvenecimiento sienten que su ser interior es joven y no les agrada ver los cambios que el tiempo ha dejado en sus rostros. En el Lifting Facial convencional pocas cosas son nuevas. En los últimos 30 años se propusieron con un éxito relativo variaciones en la técnica para lograr un alto grado de satisfacción en el paciente; sin embargo, muchos procedimientos en el mundo de la cirugía estética como son la Liposucción, Cirugía Endoscópica, los Hilos Dentados de Suspensión o Hilos Rusos, los procedimientos de relleno facial con elementos autólogos (grasa del propio paciente, por ej.) o sustancias biocompatibles (Poliacrilamida, Ácido Hialurónico, etc.) y las cirugías mínimas para el levantamiento de cejas y región frontal, contribuyeron para que los resultados sean muy satisfactorios, tanto para el profesional como para el paciente. Las cicatrices de un Lifting son discretamente perceptibles y están situadas en su mayor extensión detrás de



el SMAS ubicado entre la piel y el plano muscular para obtener un efecto más importante y duradero. La evolución post operatoria no es mayor de 10 días y los resultados justifican las discretas incomodidades que genera esta intervención.

La edad a partir de la que se sugiere practicar este procedimiento está entre los 45 a 50 años actualmente.

El lifting no debe cambiar la fisonomía del paciente si está bien realizado. Tam-

poco le quita años al paciente, pero si da un aspecto mejor y más joven, porque recoloca las facciones del paciente en el estado anterior a la flaccidez.

Agradecemos la colaboración de la Dra. Ivonne Chuquisengo Delgado, Cirujano Plástico, en la elaboración del presente artículo. ■



LA MAYORÍA DE LAS CICATRICES estarán escondidas dentro del cabello y en los pliegues naturales de la piel.

la oreja o en el cuero cabelludo. Una consideración final a tener en cuenta es asumir que el lifting debe suspender no sólo la piel sino tejidos internos como

la oreja o en el cuero cabelludo. Una consideración final a tener en cuenta es asumir que el lifting debe suspender no sólo la piel sino tejidos internos como

Compartimos la emoción y satisfacción de nuestro Director y Amigo Sr. Enrique Escardó V-G al celebrar 55 años de labor periodística, gran parte de ellos transcurridos como Director de la Revista GENTE. ■

ESCRÍBANOS:
clinarroyo@hotmail.com
www.clinicasarroyo.com
Telefax: 440-1393